



اطلاعیه شماره ۲ - ایمنی دارویی

@ داروهای هشدار بیالا، مشابه و پیچجال با بر جسب مشخص شده از داروخانه تحويل بگیرید.

@ داروی کرباید بتاسیم (KCl) در جعبه قرمز در کمد ایستگاه پرستاری قرار داشت.

@ داروهای پیچجال بدون Cold box از داروخانه تحويل نگیرید.

@ داروی نارکوتیک به صورت این در گمد قفل دار نگهداری کنید.

@ داروی باق مانده پیچجال بر اساس شرکت سازنده در مدت زمان مشخص در پیچجال نگهداری و تاریخ باز شدن ویال بر روی آن ثبت کنید.

@ کنترل و ثبت درجه پیچجال نگهداری دارو و لزایی باشد.

ایمنی بیمار

اصول صحیح دارودهی به بیماران
7 RIGHTS



موارد قابل توجه
در دسته های دارویی

- ۱- داروهای پر خطر
- ۲- داروهای مشابه
- ۳- داروهای خود به خود متوقف شونده
- ۴- داروهای چند دوزی
- ۵- داروهای حیاتی
- ۶- داروهای یخچالی

مرکز آموزشی، درمانی پیمانیه
واحد ایمنی بیمار



راه حل ایمنی بیمار

توجه به داروها با نام و تلفظ مشابه



توجه به مشخصات فردی بیمار



ارتباط مؤثر در زمان تحویل بیمار



انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار



کنترل غلظت محلولهای الکترولیت



اطمینان از صحت دارودرمانی و تلفیق دارویی



اجتناب از اتصالات نادرست سوندها ولوله



استفاده صرفاً یکبار از وسایل تزریقات



بهبود پهداشت دستها



مرکز آموزشی، درمانی پیمانیه - واحد ایمنی بیمار

ساعت ناشتا (NPO) بیماران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهود
مرکز آموزشی، درمانی پیمانیه

ماده بله شده

مایعات صاف شده (آب، آب میوه فاقد تفاله،
چای صاف شده، نوشابه گاز دار، قهوه سیاه)

شیر مادر

شیر خشک

شیر غیر انسان

غذای سبک (نان برسته به همراه مایعات صاف)

غذای سنتگین (غذای سرخ کرده یا شامل غذای
چرب یا گوشت باشد).



حداقل دوره ناشتا

(برای تمام سنین قابل اجرا است)

دو ساعت

چهار ساعت

شش ساعت

شش ساعت

شش ساعت

هشت ساعت



این توصیه ها برای بیماران سالمی که تحت اعمال جراحی انتخابی قوار می گیرند بجز زنان حامله قابل اجرا می باشد.

تضیینی نمی دهد که تخلیه معده بیمار انجام شده است.

بیمار هر داروی ضد فشار خون، دیابت، تیروئید، داروی قلبی بجز آس آ و پلاویکس که مصرف می کند را با پنج سی سی آب

صبح روز عمل می تواند مصرف کند.

واحد آموزش بیمار